

FICHE PRATIQUE POUR LE PHARMACIEN D'OFFICINE

CYSTITE AIGÛE SIMPLE



SITUATION 1

LA PATIENTE SE PRÉSENTE SPONTANÉMENT À L'OFFICINE

Étape 1 : Grille d'éligibilité : Vérification des critères

Femme

Âgée de 16 à 65 ans inclus

Présentant des symptômes évocateurs de cystite aigüe simple (pollakiurie, brûlures mictionnelles)

Symptômes d'apparition récente

Apte à communiquer des informations médicales suffisantes

Absence de fièvre (>38°C) ou hypothermie (<36°C) ou frissons

Absence d'autres symptômes suggérant une pyélonéphrite (douleur au niveau des fosses lombaires ou au niveau des flancs, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales)

Absence de risque de grossesse

Absence de signes d'appel gynécologique : leucorrhées, prurit vulvaire ou vaginal

Absence de cystite à répétition : < 3 épisodes dans les 12 derniers mois

Absence d'épisode de cystite dans les 15 derniers jours

Absence d'anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire (uropathie, résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, geste chirurgical récent, endoscopie ou sondage)

Absence d'immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, chimiothérapie, immunosuppresseurs)

Absence de port de cathéter veineux implanté

Absence d'insuffisance rénale sévère (DFG \geq 30 mL/min/1,73 m² selon CKD-EPI)

Absence d'antibiothérapie en cours pour une autre pathologie

Absence de prise de fluoroquinolones dans les 3 précédents mois (risque de sélection de germes résistants)

Aucune intolérance médicamenteuse ou allergie signalée

Locaux adaptés :

- espace de confidentialité
- point d'eau / SHA
- sanitaires



Formation

- agréée
- durée de 4h
- e-learning possible



Conseils patients



Traçabilité et partage des informations avec médecin

traitant :

inscription dans le DMP ou envoi par messagerie sécurisée ou remise d'une attestation papier au patient

Facturation :

transmettre la facture et enregistrer dans le DMP le compte-rendu : **"Prise en charge à l'officine de la cystite simple de la femme"**

SI LA PATIENTE EST ÉLIGIBLE



Étape 2 : Éliminer les signes de gravité

- Température comprise entre 36 et 38°C
- Pression Artérielle Systolique > 90 mmHg
- Fréquence Cardiaque < 110/mn
- Fréquence Respiratoire < 20/mn

SI UN SIGNE DE GRAVITÉ :

Orienter vers le médecin



SI AUCUN SIGNE DE GRAVITÉ



Étape 3 : Réalisation du TROD

N Nitriturie	L Leucocyturie	Négatif	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas de délivrance d'antibiotique			
		Positif	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SI TROD POSITIF



Étape 4 : Délivrance de l'antibiotique

1ère intention
Fosfomycine trométamol
3 g en prise unique

OU

Si allergie
Pivmecillinam
400 mg 2 fois par jour pendant 3 jours



SITUATION 2

LA PATIENTE EST ORIENTÉE PAR UN MÉDECIN OU UNE SAGE FEMME

Si présence d'ordonnance conditionnelle, vérifier sa validité (âge de 16 à 65 ans)



Réalisation du TROD



Si TROD positif → Délivrance de l'antibiotique prescrit

